

ผลข้างเคียงที่สามารถพบได้ คือ...

เกิดเลือดออกเล็กน้อย

จัดการได้ด้วยตัวเอง



การเกิดรอยฟกช้ำง่ายกว่าปกติ



เลือดออกจากจมูก



15-20

ใช้เวลานานขึ้นเพื่อหยุดเลือดออก
จากแผลที่มีการฉีกขาด โดยกดแผล
อย่างต่อเนื่อง ประมาณ 15-20 นาที
หรือจนกว่าเลือดจะหยุดไหล

เหตุการณ์เลือดออกมาก

ควรรีบพบแพทย์ทันที เพื่อได้รับการรักษาในโรงพยาบาล



เลือดออกในศีรษะ



กระเพาะอาหาร หรือลำไส้
จำเป็นต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล



แพทย์จะให้ยากับคุณเพื่อป้องกัน
การเกิดภาวะเลือดออก

หากท่านมีอาการเลือดออกผิดปกติ ควรรีบพบแพทย์ทันที เพื่อได้รับการรักษาอย่างถูกต้องและเหมาะสม

วิธีการควบคุมความเสี่ยง

1. ทานยาตามที่แพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด**
2. ระงับการใช้ยาอื่นร่วม โดยเฉพาะยาต้านการอักเสบ / ยาแก้ปวด
3. ควบคุมโรคร่วมให้อยู่ในภาวะปกติมากที่สุด เช่น การควบคุมระดับความดันให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม
4. สังเกตอาการผิดปกติ เช่น จ้ำเลือด เลือดออกตามไรฟัน
5. ตรวจสอบติดตามกับแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ
6. แจ้งแพทย์ทุกครั้งก่อนทำหัตถการหรือผ่าตัด
7. กดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
8. หลีกเลี่ยงกิจกรรมเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ

ความเสี่ยงและวิธีควบคุม

ระหว่างการใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือด



สแกนเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

“ผู้ป่วยควรพิจารณาทางเลือกของตนเองอย่างถี่ถ้วนและพิจารณาว่าอะไรคือสิ่งที่คุณกังวลมากกว่าระหว่างการลดความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองหรือการจำกัดความเสี่ยงของการเกิดเลือดออก”

สื่อนี้ได้รับการสนับสนุนจาก
บริษัท ไดอิชิ ชังเคียว (ประเทศไทย)
ในรูปแบบของการจัดทำการผลิตสื่อเพียงอย่างเดียว
เนื้อหาในสื่อไม่ได้รับอิทธิพลแต่อย่างใดจากผู้สนับสนุน

